ИАЛ
ОДОБРЕНО!
ДАТА 26-05-03

Информация за пациента

Уважаеми пациенти,
Моля прочетете внимателно тази листовка, тъй като тя съдържа важна за Вас информация. Ако имате допълнителни въпроси, обърнете се към лекуващия лекар или фармацевт.

Prospan® - Проспан

Муколитик – Спазмолитик – Облекчава кашлицата
Без алкохол – Без захар – Без оцветители

Състав
100 ml сироп съдържа:
0,7 g Hedera helix folium, extractum siccum - сух екстракт от листа на бръшлян (Dried Ivy Leaf Extract)(5-7, 5:1). Извличащ агент: етанол 30 %.

Помощни вещества: калиев сорбат, сорбитол 70%, безводна лимонена киселина, ксантанова гума, есенция, пречистена вода.

Какво представлява Проспан?
Сироп за кашлица. Бутилки от 100 ml сироп.

Prospan® съдържа сух екстракт от листа на бръшлян, чийто терапевтичен ефект при заболявания на въздухоносните пътища, се дължи на секретолитичните, спазмолитичните и антитусивните свойства на гликозидните сапонини, които съдържа.

За какво се използва Проспан?
Проспан се използва за симптоматично лечение на хронични възпалителни бронхиални заболявания и при остро възпаление на дихателните пътища, придружено с кашлица.

Кога не трябва да взимате или да използвате Проспан?
При свръхчувствителност към някоя от съставките.
Да не се прилага при деца под 1 година.

Какви предпазни мерки трябва да имате предвид при употреба на Проспан?
Поради липсата на данни за поносимостта по време на бременност и кърмене, продуктът може да се употребява само след консултация с лекар.
Няма влияние върху способността за шофиране и работа с машини.

Кои други продукти оказват влияние върху ефекта на Проспан или могат да бъдат повлияни?
Досега не са известни прояви на нежелани лекарствени реакции при едновременната употреба на Проспан с други лекарства. Следователно използването на продукта заедно с други лекарства, напр. антибиотици, е безопасно.

Специални предупреждения
Неподходящ при вродена непоносимост към фруктоза. Може да причини стомашно дразнене и диария.
В 2,5 ml сироп (около 1 чаена лъжичка) се съдържа 0,963 g сорбитол (= 0,08 хлебни единици).
Съдържа калиев сорбат – има дразнещо действие и може да причини дерматит.

Как можете да използвате Проспан?
Ако не е предписано друго, малки деца (от 1 до 4 години) приемат по една чаена лъжичка от сиропа (2,5 ml) 3 пъти дневно; деца и юноши (от 4 до 16 години) приемат по 2 чаени лъжички от сиропа (5 ml) 3 пъти дневно; възрастни приемат по 2-3 чаени лъжички от сиропа 3 пъти дневно.
Преди употреба бутилката се разклаща добре.

Продължителността на лечението зависи от вида и тежестта на клиничната картина. Дори и при леки възпаления на дихателните пътища, лечението трябва да продължи най-малко една седмица. За да има терапията траен успех, лечението с Проспан трябва да продължи 2-3 дни след преминаване на симптомите.

В случаи на постоянни оплаквания или поява на задух, треска, както и на гнойни или кървави храчки, се налага консултация с лекар.

Какво трябва да предприемете, ако сте приели по-голямо количество от Проспан?
Няма съобщени случаи на предозиране.

Какви нежелани реакции може да предизвика Проспан?
В редки случаи може да има лаксативен ефект, поради съдържанието на сорбитол в продукта.
В редки случаи е възможна проявата на реакции на свръхчувствителност към някоя от съставките на продукта.

Съхраняване на Проспан сироп
Да се съхранява на сухо място, под 25° С.
Да се съхранява на място, недостъпно за деца!

Срок на годност
Срокът на годност е 3 години.
Да не се използва след изтичане срока на годност, отбелязан на опаковката!

Производител и притежател на разрешението за употреба
Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. Kg
Herzbergstrasse 3
61138 Niederdofelden, Germany

Медицинско представителство в България:
Либра АД

Дата на последна редакция на листовката
Април 2002

